

Avertissements agricoles

Publication périodique

EDITION "GRANDES CULTURES"

ISSN 0757 4029

BULLETIN TECHNIQUE N° 25

8 SEPTEMBRE 1988

COLZA : Surveillez les Limaces et les Altises dès le semis.
 BETTERAVES : Attention à un éventuel redémarrage des attaques de noctuelles.
 CERALES A PAILLE : Traitements de semence.

- COLZA -

LIMACES :

● Dès le semis, surveillez leur activité en posant des pièges dans la parcelle (voir précédent bulletin).

→ Si vous observez une quantité non négligeable de Limaces mortes, traitez sans attendre les premiers dégâts, avec : Granulés à base de métaldéhyde : 5 à 10 kg/ha - MESUROL anti-limaces : 3 kg/ha - SKIPPER : 5 kg/ha.

Rechercher une répartition régulière de 25 granulés/m². Ne pas disposer les granulés en tas pour éviter toute toxicité à l'égard du gibier.

ALTISES :

● Installez immédiatement les cuvettes jaunes de piégeage.

Elles vous permettront de repérer l'arrivée, sur vos parcelles, des grosses Altises puis, à partir du 15 Octobre, des Charançons du bourgeon terminal (dans les zones concernées par ce ravageur). Elles doivent être placées à 10 m de la bordure du champ, du côté d'un ancien champ de colza et remplies avec de l'eau contenant quelques gouttes de mouillant (liquide vaisselle).

Enterrées jusqu'au stade "2 feuilles vraies" (les altises se capturent au hasard lors de leurs déplacements nocturnes), elles devront ensuite être posées à même le sol pour détecter les arrivées de Charançon du bourgeon terminal (capture par attraction visuelle). Ces cuvettes peuvent être commandées auprès des Ets MINO-GAILLARD - 11, rue Pasteur - 01100 OYONNAX (Référence 3336).

- BETTERAVES -

RAVAGEURS :

● Une première vague de noctuelles défoliatrices avait occasionné quelques dégâts insignifiants aux cultures courant Juillet.

● Pour l'instant, il n'a pas encore été détecté de présence de larves de 2^e génération, mais, dans le cas d'une sortie massive, de gros dégâts pourraient intervenir en quelques jours.

→ Bien surveiller les parcelles, et traitez avec une pyrèthrinoïde si vous observez une reprise des dégâts, qui peut être brutale.

- ORGES D'HIVER -

MOSAÏQUE JAUNE DE L'ORGE :

● Cette maladie est due à un virus qui se multiplie dans les racines des céréales et se conserve dans le sol pendant au moins 10 ans.

Abonnement annuel : 150 F

Chèque à l'ordre du Régisseur de Recettes

à envoyer à l'adresse ci-dessous.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, Rue de Curambourg - B.P. 210

45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX - Tél. (38) 86 36.24

EDITION DE LA STATION "CENTRE"

(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret)

Imprimerie de la Station "Centre"

Le Directeur-Gérant A. SIMONIN

CPPAP N 530 AD



743

● En début de printemps, les zones atteintes manifestent un jaunissement et un retard de végétation. Dans les cas d'attaque intense, les jeunes feuilles observées par transparence présentent de petits tirets décolorés le long des nervures.

● Si le printemps est froid, les symptômes de maladie restent visibles pendant 2 à 3 mois et de sérieuses chutes de rendement peuvent être observées. En cas de printemps chaud, les symptômes s'estompent rapidement et la nuisibilité de la maladie est moindre.

● En 1988, il n'a pas été effectué de prospection systématique appuyée sur un diagnostic sérologique ELISA. Cependant, le diagnostic visuel a permis de détecter de nombreux cas d'attaque en Champagne Berrichonne et zones limitrophes (18 - 36), en plus du foyer déjà bien connu du Drouais-Thymerais (28).

➔ Dans ces zones atteintes, éviter le transport de la maladie d'une parcelle à une autre en nettoyant les outils de travail du sol entre chaque parcelle.

➔ Sur les parcelles, ou plutôt sur les exploitations atteintes, la seule méthode de lutte utilisable consiste en l'utilisation de variétés tolérantes. :

- Escourgeons : Express, Gaulois, Franka.

- Orges à 2 rangs : Mosar, Mélusine, Torrent, Diana, Sonate.

- CEREALES D'HIVER -

TRAITEMENTS DES SEMENCES :

● Le traitement des semences est un facteur important pour la bonne réussite de la culture. Plus de 60 spécialités sont commercialisées, offrant des niveaux de protection variables : protection de base ou protection renforcée contre Charbon nu, Mouche grise ou Oïdium.

● Les tableaux suivants, publiés dans Phytoma de Juin 1988, d'après les travaux de Jacques BOURDIN, Rémi CHAMPION et collaborateurs, font le point des efficacités des produits utilisables.

A noter :

➔ **Mouche grise** : Le traitement de semences efficace reste la méthode de lutte de base contre ce ravageur. Ce type de traitement est à recommander fortement sur semis tardifs en conditions difficiles (température froide, sol motteux humide) derrière précédents pois déchaumé de bonne heure ou betterave.

➔ **Taupins** : En cas de risque important, un traitement en plein avec 1500 g de lindane, 15 jours avant semis ou en couverture en post-levée, donnera les meilleurs résultats. Un traitement à l'époque de la germination des graines est à déconseiller.

➔ **Charbon nu de l'orge** : La présence de souches résistantes aux anilides étant bien établie, préférer l'utilisation de produits à base de triazoles sur les variétés sensibles à cette maladie (Viva, Panda,...).

➔ **Charbon nu du blé** : Cette maladie a été réintroduite en France en 1986-87 à l'occasion de l'importation, en provenance des USA, de blé dur Cando contaminé. Il n'était pas rare de voir des symptômes en culture en 1988. Dans les parcelles de variétés sensibles (Cando,...) destinées à la multiplication de semences, utilisez impérativement un produit efficace sur cette maladie, à base d'anilides ou de triazoles. Cette précaution s'impose beaucoup moins pour du blé ou du blé dur destiné à la consommation.

ERGOT DU SEIGLE ET DU BLE :

La prévention des attaques ne dépend pas du traitement de semences. Un bon désherbage antigraminée évite les contaminations intermédiaires sur graminées sauvages.

Un triage soigné des semences limite l'apport d'inoculum sur la parcelle.


EFFICACITES des matières actives utilisées en traitement de semences :

ACTIVITES INSECTICIDES ET CORVIFUGE

MATIERES ACTIVES	DOSES D'EMPLOI (g/q)	TAUPINS	MOUCHES GRISES	CORBEAUX
diéthion	150		++ ou +++	
fonofos	175	++	+++	
lindane	40 à 50	++		
lindane + endosulfan	40 + 100	++	++ ou +++	++
anthraquinone	50			++
endosulfan	100			++
triacétate de guazatine	80			++

++ Bonne efficacité - +++ Efficacité excellente - ☐ Efficacité insuffisante ou non connue

PRINCIPALES MALADIES DE LA BETTERAVE : 3 stratégies possibles... mais 1 traitement principal



CRITÈRES
DE DÉCISION



Stratégie 1

- Apparition tardive des premiers symptômes de maladies
- Un seul traitement suffit

TRAITEMENT PRINCIPAL
COMPLEXE PARASITAIRE
Produit polyvalent

Stratégie 2

- Apparition précoce de ramulariose ou de cercosporiose selon les zones... et d'oïdium
- Pour couvrir la période de risques, un 2e traitement est souvent nécessaire

TRAITEMENT PRINCIPAL
RAMULARIOSE,
CERCOSPORIOSE, OÏDIUM
Produit avec une bonne efficacité sur ces 3 maladies

TRAITEMENT 2
COMPLEXE PARASITAIRE
Produit polyvalent

Stratégie 3

- Apparition précoce d'oïdium
- Un 2e traitement sera effectué à l'apparition des autres maladies

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
OÏDIUM
Soufre

TRAITEMENT PRINCIPAL
COMPLEXE PARASITAIRE
Produit polyvalent très efficace sur ramulariose

Dans le cas de deux traitements, ne pas utiliser la même matière active pour éviter les risques de résistance.



Juin 1988

Stratégie élaborée en collaboration avec l'I.T.B.

PRINCIPALES MALADIES DE LA BETTERAVE : les produits de traitement

Matières actives	Spécialités commerciales	Dose spéc. par ha	Oïdium	Ramulariose	Cercosporiose	Rouille
<i>flutriafol</i>	Impact	1 l	★	★	★	★
<i>carbendazime + flutriafol</i>	Impact R Impact RM	1 l 0,8 l	★	●	○	●
<i>flusilazol + carbendazime</i>	Punch C	0,5 l	★	★	★	★
<i>carbendazime + fenpropimorphe + mancozèbe</i>	Corvet CM	2 kg	○	○	○	○
<i>fentine hydroxyde + soufre</i>	Topsuc	7 l	○	○	○	
<i>bitertanol</i>	Baycor 300 EC	0,8 l	○	★	○	●
<i>mancozèbe</i>	Nombreuses spécialités	3200 g m.a./ha		○	○	○
<i>carbendazime + triadiméfon</i>	Bayleton total	1 kg	○		○	
<i>carbendazime + fénarimol + manèbe</i>	Rimidine plus	2,5 kg	○		○	
<i>manèbe + soufre micronisé + thiophanate méthyl</i>	Peltisan *	10 kg	●		○	
<i>fentine-acétate + manèbe</i>	Brestan 10	2,5 kg		○	○	
<i>fénarimol</i>	Rubigan 4	1 l	○			
<i>fenpropimorphe</i>	Corbel	1 l	●			
<i>soufre micronisé</i>	Nombreuses Spécialités	6000 g m.a./ha	●			
<i>triadiméfon</i>	Bayleton 25	1 kg	○			
<i>carbendazime + manèbe + soufre micronisé</i>	Blédor 3	8 kg	○			
<i>carbendazime + manèbe + soufre</i>	Volnèbe	8 kg	○			
<i>bénomyl</i>	Benlate *	0,3 kg			○	
<i>carbendazime</i>	Nombreuses* spécialités	0,3 kg			○	
<i>manèbe + thiophanate méthyl</i>	Peltar *	2 kg			○	

* Produit à efficacité réduite sur cercosporiose en situation de souches résistantes

★ A confirmer

● Très bon ○ Bon ○ Moyen